



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI

CARGO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

DATA DA PROVA: 07/07/2019 - MANHÃ

CARGO: ODONTOPEDIATRA (NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 04; Matemática 05 a 07;

Conhecimentos Gerais: 08 a 10. Conhecimentos Específicos: 11 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA

O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do romance *Memórias Póstumas de Brás Cubas*, de Machado de Assis. Considere-o para responder às questões seguintes.

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

- a) Argumenta que, para entender o que se passou com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório compreender o que se passou em sua mente.
- b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo imaginativo, dando a entender, porém, que isso não é fundamental para que o leitor entenda a história.
- c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos romances da época, os narradores enfatizarem mais os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
- d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, pois se coloca acima delas, como se estas devessem agradecê-lo por sua ajuda.

02. No início do parágrafo, o narrador afirma que “ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale a alternativa que contém o termo que exerce nessa oração a função sintática de sujeito.

- a) Ainda.
- b) Ninguém.
- c) Próprio.
- d) Delírio.

03. Nessa parte do romance, o narrador confessa que alguns dos seus leitores talvez não sejam dados à “contemplação destes fenômenos mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, marque a alternativa que NÃO apresenta um de seus significados possíveis.

- a) Apreciação.
- b) Consideração.
- c) Observação.
- d) Refutação.

04. No parágrafo selecionado, em determinado momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

- a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo está no presente do indicativo.

- b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples da oração principal.
- c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o próprio delírio.
- d) Se trata de um artigo definido, e é usado para conjugar corretamente o verbo.

QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

- a) Dez mil.
- b) Cem mil.
- c) Um milhão.
- d) Dez milhões.

06. Um conjunto A possui 20 elementos. A intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 3 elementos, já a união entre os dois conjuntos possui 30 elementos. Quantos elementos possui o grupo B?

- a) 10 elementos.
- b) 13 elementos.
- c) 15 elementos.
- d) 17 elementos.

07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO afirmar:

- a) A quantidade de vértices de um polígono é necessariamente igual a sua quantidade de lados.
- b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados é chamada de área.
- c) Possuem ângulos internos maiores que 180° .
- d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.

QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito da crise política que atualmente ocorre em um dos países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e líder da oposição, _____, se declarou nesta quarta-feira presidente interino do país e foi reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da democracia’, disse em discurso na capital”.

(G1, 23/01/19, com adaptações)

- a) Evo Morales.
- b) Fidel Castro.
- c) Hugo Chávez.
- d) Juan Guaidó.

09. No campo das relações internacionais, a China destaca-se como um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir e assinale a que indica dois dos principais produtos brasileiros exportados para a China.

- a) Soja e petróleo.
- b) Ouro e diamantes.
- c) Automóveis e aeronaves.
- d) Eletrônicos e manufaturados.

10. A matéria jornalística a seguir, publicada em maio deste ano, aborda uma recente polêmica ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes históricas. Examine-a e assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco de um protesto hoje durante uma sessão solene em homenagem aos cento e trinta e um anos da assinatura da _____, que deu fim à escravidão no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. A declaração não foi bem recebida pelo público presente na Casa, a maioria ligada ao movimento negro”.

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

- a) Lei Áurea.
- b) Abertura dos Portos.
- c) Lei do Ventre Livre.
- d) Primeira Constituição.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Um sistema adesivo odontológico deve promover a resistência à separação de um substrato aderente de um material restaurador. O condicionamento ácido do esmalte cria uma descalcificação seletiva, formando poros que aumentam o embricamento mecânico pela penetração da resina formando o que se chama de “tags”. De acordo com os fatores que podem afetar o sucesso do sistema adesivo no esmalte dentário, analise as afirmativas a seguir:

I – As superfícies condicionadas devem ser mantidas limpas e molhadas até que o adesivo seja aplicado.

II – Uma vez que o dente é condicionado, o ácido deve ser removido com enxague com um jato de água por aproximadamente 20 segundos.

III – O tempo ideal de aplicação do agente condicionante pode variar, dependendo de exposições prévias da estrutura dental ao flúor.

IV – Quando apenas o esmalte é condicionado, a superfície deve ser seca até que o esmalte adquira uma aparência esbranquiçada e fosca.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

12. Os selantes dentários constituem uma importante tecnologia de prevenção da cárie dentária, quando utilizados idealmente em combinação com a educação do paciente, higiene oral efetiva, fluoretos e visitas regulares ao dentista. De acordo com as recomendações para a utilização de selantes, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A avaliação do risco de cárie do indivíduo e do dente é importante como determinante da necessidade do selante.
- b) O risco de cárie nas superfícies com fóssulas e fissuras não permanece na fase adulta.
- c) Os selantes não devem ser aplicados em dentes que já passaram da fase pós-eruptiva.
- d) Os selantes devem ser utilizados para tratar dentes com lesões de cárie em esmalte ou dentina.

13. A anestesia local é a perda temporária de sensação ou de dor, produzida por um agente topicamente aplicado ou injetado, sem deprimir o nível de consciência. Prevenir a dor durante procedimentos odontológicos pode fomentar o relacionamento entre o cirurgião-dentista e o paciente, construindo confiança e diminuindo a ansiedade. Em relação à escolha da solução de anestésico local, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A história médica e o estado de desenvolvimento físico e mental da criança devem ser levados em consideração.
- b) O uso de vasoconstritores associados aos anestésicos locais é recomendado para diminuir o risco de toxicidade do anestésico.
- c) O tempo estimado de duração do procedimento odontológico deve ser levado em consideração.
- d) No caso de alergia a bissulfitos, o uso de anestésico local com vasoconstritor é indicado.

14. A saúde bucal é parte inseparável da saúde geral e do bem-estar de todas as pessoas. Os pacientes com necessidades especiais têm risco

aumentado para desenvolver doenças bucais, significando impacto direto e negativo em sua saúde geral. Em relação ao atendimento de pacientes com necessidades especiais, analise as afirmativas a seguir:

I – A mucosite é a complicação bucal mais frequente em crianças submetidas à quimioterapia.

II – O uso de selantes não está indicado para pacientes com necessidades especiais.

III – O laser de baixa intensidade tem uma boa ação terapêutica quando utilizado nos estágios iniciais de infecções virais.

IV – Pacientes que recebem quimioterapia podem experimentar alterações temporárias na quantidade e qualidade da saliva.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

15. A profilaxia antibiótica da endocardite infecciosa representa um dos principais e mais comuns cuidados que devem ser tomados pelo cirurgião-dentista no contexto de um tratamento odontológico na criança cardiopata. De acordo com a American Dental Association, assinale a alternativa a seguir que apresente o atual esquema profilático com antibióticos para crianças cardiopatas:

- a) Clindamicina (50 mg/kg) – via oral – 2 horas antes do procedimento.
- b) Amoxicilina (50 mg/kg) – via oral – 1 hora antes do procedimento.
- c) Azitromicina (50 mg/kg) – via oral – 1 hora antes do procedimento.
- d) Amoxicilina (20 mg/kg) – via oral – 1 hora antes do procedimento.

16. O cimento de ionômero de vidro atualmente é considerado o material de escolha para uma variedade de procedimentos clínicos em Odontopediatria. Sua utilização é interessante devido às suas propriedades satisfatórias, dentre elas, a adesão aos tecidos mineralizados, a biocompatibilidade e a liberação de flúor. Em relação à manipulação do cimento de ionômero de vidro, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O pó e o líquido devem ser dispensados somente no momento da mistura, para que não ocorra a evaporação da água contida no componente líquido.
- b) O tempo de manipulação utilizado deve ser o recomendado pelo fabricante.
- c) O material deve ser manipulado até apresentar aparência opaca, para assim ser inserido na cavidade.

d) O pó deve ser dividido em duas partes iguais, incorporando-as separadamente ao componente líquido.

17. A determinação do posicionamento de dentes retidos e impactados, corpos estranhos, e condutos radiculares são de grande importância para o planejamento de tratamentos odontológicos. As radiografias convencionais são exames de baixo custo associadas às baixas doses de radiação. Em relação ao Método Radiográfico de Clark, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A primeira radiografia é tomada de maneira convencional, em que o feixe central incide paralelo às faces proximais dos elementos da área.
- b) Na segunda radiografia altera-se o ângulo horizontal de incidência, fazendo o feixe incidir no sentido mesio-radial ou disto-radial.
- c) Os filmes para as ambas tomadas radiográficas devem ser colocados na boca em uma mesma posição.
- d) Quando o feixe de raio X é movido para a direita, o objeto mais distante se moverá para a esquerda.

18. O deslocamento total do dente para fora de seu alvéolo é também chamado de avulsão e é mais comum nos jovens, pela grande resiliência do osso alveolar e, em geral, pela rizogênese incompleta. Em relação às avulsões dentárias e seus tratamentos, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O replante de dentes com rizogênese incompleta mantidos em meios de armazenamento inadequado, porém com período extra bucal não excedendo 120 minutos, apresenta um prognóstico favorável.
- b) Nos dentes com rizogênese completa, cujo replante foi imediato ou que foram mantidos em meio adequado por um período menor que 60 minutos, o tratamento endodôntico não está indicado.
- c) A imobilização de dentes reimplantados não deve ser realizada após o reposicionamento, pois pode prejudicar a estabilidade no período inicial de cicatrização.
- d) Os fatores mais decisivos para a revascularização pulpar são o diâmetro apical no momento do replante, a duração do período extrabucal e tipo de meio de armazenamento.

19. A radiografia interproximal ou Bite-wing é um exame usado para, essencialmente, visualizar as coroas dos dentes superiores e inferiores numa só imagem, sendo bastante utilizado para a detecção de lesões de cáries incipientes localizadas nas superfícies proximais de pré-molares e molares. Em relação à técnica radiográfica Bite-wing, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Para crianças menores, pode-se utilizar filmes radiográficos periapicais dobrados ou filmes radiográficos infantis.
- b) A técnica utilizada para crianças é diferente da técnica utilizada para adultos.
- c) Na tomada radiográfica, a criança deverá fixar o filme com o dedo indicador da mão do lado oposto ao lado a ser radiografado.
- d) O feixe central de raios X deve ser dirigido com ângulo aproximado de 45° positivos sobre o plano oclusal.

20. A partir do momento em que os dentes irrompem, eles já podem receber os benefícios do contato com o flúor, mas cabe ao Odontopediatra recomendar e definir a melhor maneira de utilizá-lo. Em relação aos bochechos com flúor, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A aplicação pode ser realizada fora do ambiente clínico, não havendo necessidade de profilaxia prévia para remoção da placa bacteriana.
- b) A aplicação deve ser realizada apenas por cirurgiões-dentistas, devido à complexa técnica de uso.
- c) Em crianças de 3 a 5 anos, o método pode ser utilizado mesmo sem supervisão direta.
- d) Após o bochecho, aconselha-se não ingerir nada por, no mínimo, 90 minutos.

21. A anestesia regional pterigomandibular está indicada para intervenções em todos os dentes inferiores decíduos e permanentes, bem como para intervenções no tecido ósseo e mucoso da mandíbula e do lábio inferior. Em relação à técnica da anestesia regional pterigomandibular em Odontopediatria, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A linha oblíqua externa é um ponto de reparo a ser observado para a execução da técnica.
- b) A técnica na criança deverá ser realizada numa posição ligeiramente mais baixa e mais para anterior do que no adulto.
- c) A técnica indireta também é chamada de técnica das três posições da agulha.
- d) Para a punção, a seringa deve ser colocada na altura dos molares decíduos ou pré-molares do lado oposto a ser anestesiado.

22. Diferentes tipos de traumatismos podem ocorrer nos dentes decíduos, sendo importante o pronto atendimento pelo Odontopediatra para solucionar os problemas físicos e emocionais da criança e de seus familiares e para que seja realizado o monitoramento clínico. De acordo com a classificação das lesões por luxação em dentes decíduos, analise as afirmativas a seguir:

- I – A luxação lateral envolve ruptura e laceração das fibras do ligamento periodontal e, clinicamente, observa-se o dente em infra-oclusão.
- II – Na concussão, como a lesão ao feixe vasculonervoso é mínima, o prognóstico pulpar é favorável.
- III – A concussão restringe-se às fibras do ligamento periodontal e não provoca mobilidade anormal do dente acometido.
- IV – Na subluxação ocorre a ruptura de fibras do ligamento periodontal, aumentando a mobilidade do dente acometido.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

23. O efeito tóxico dos anestésicos locais deve-se tanto ao anestésico quanto ao vasoconstritor, estando este último intimamente relacionado à maior ocorrência de injeções intravasculares. Em relação à prevenção de doses anestésicas excessivamente tóxicas em Odontopediatria, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Deve-se procurar utilizar o maior volume de concentração possível necessário para se obter anestesia satisfatória.
- b) A solução anestésica deve ser injetada rapidamente, pois a velocidade da injeção é um fator na rapidez de absorção do medicamento.
- c) É indicado reduzir a dose total máxima de anestésico local a 1/3 quando se tratar de criança debilitada.
- d) A vascularização da área na qual o anestésico está sendo injetado precisa ser considerada, pois quanto mais vascularizada, mais lenta será a absorção, aumentando a possibilidade de efeito tóxico.

24. Apesar da prevalência de cárie ter sofrido um declínio nos últimos tempos, o comprometimento do órgão pulpar em decorrência de traumatismos é altamente relevante em crianças e, dependendo da extensão das estruturas dentárias afetadas, torna-se necessária a realização do tratamento endodôntico. Em relação à técnica de biopulpectomia em dentes decíduos, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O uso do curativo de demora não é necessário em casos de biopulpectomia.
- b) Não há a necessidade de neutralização do conteúdo tóxico a fim de evitar a extrusão de conteúdo necrótico para a região periapical.
- c) O hipoclorito de sódio a 1% não é indicado como solução irrigadora durante a instrumentação.

d) Após a remoção completa do tecido cariado, da polpa coronária e cateterismo do canal radicular, deve-se efetuar a odontometria, 2 mm aquém do limite do bisel de rizólise.

25. A ocorrência de cárie dentária nos primeiros anos de vida apresenta algumas características peculiares, como o surgimento de manchas brancas e cavidades logo após a erupção dentária, vários dentes sendo afetados e alta velocidade de progressão. De acordo o National Institute for Dental and Craniofacial Research, assinale a alternativa a seguir que apresenta a CORRETA definição do termo Cárie Precoce da Infância (CPI):

- a) Presença de três ou mais superfícies cariadas, perdidas ou restauradas em molares decíduos em uma criança com até 7 anos de idade.
- b) Presença de uma ou mais superfícies cariadas, perdidas ou restauradas em qualquer dente decíduo em uma criança com até 5 anos de idade.
- c) Presença de quatro ou mais superfícies cariadas, perdidas ou restauradas em dentes anteriores decíduos em uma criança com até 5 anos de idade.
- d) Presença de uma ou mais superfícies cariadas, perdidas ou restauradas em qualquer dente decíduo em uma criança com até 7 anos de idade.

26. A cárie dentária na infância apresenta uma dimensão multifatorial, amplamente demonstrada em estudos que identificam fatores de risco individuais nos seguintes níveis: demográfico, socioeconômico, comportamental e biológico. Assinale a alternativa a seguir que apresente um fator de risco de cárie dentária na infância classificado como comportamental:

- a) Ambiente familiar.
- b) Acesso a serviços de saúde bucal.
- c) Introdução precoce da sacarose.
- d) Escolaridade dos pais.

27. O aconselhamento nutricional na infância tem sido apontado como um dos grandes desafios para a Organização Mundial da Saúde com vistas à melhoria de desfechos em saúde geral e saúde bucal. De acordo com os dez passos para uma alimentação saudável na infância propostos pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Dar somente leite materno, água e chás até os seis meses de idade.
- b) Ao completar seis meses de idade, dar alimentos complementares três vezes ao dia, se a criança estiver em aleitamento materno.
- c) Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições.
- d) A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida com colher.

28. O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) atualmente é entendido como uma abordagem minimamente invasiva que compreende medidas preventivas, terapêuticas e restauradoras em relação à cárie dental e no controle dessa doença. O tratamento é feito apenas com a utilização de instrumentos manuais e com o uso do cimento de ionômero de vidro. Em relação ao ART, analise as afirmativas a seguir:

- I – O ART pode ser utilizado no atendimento de pacientes com necessidades especiais.
- II – O atendimento de bebês é uma das contraindicações do ART.
- III – O ART é a alternativa de escolha para o tratamento de dentes com sinais de pulpíte irreversível.
- IV – O ART deve ser utilizado, exclusivamente, para restaurações de lesões cariosas em esmalte.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

29. A cárie dentária em crianças pode ocorrer em todas as superfícies de todos os dentes. Entretanto, existe uma hierarquia nos dentes e superfícies atingidos, que pode variar de acordo com a idade, a cronologia de erupção dentária e práticas alimentares. De acordo com distribuição de lesões de cárie na dentição decídua, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os molares inferiores são normalmente os primeiros dentes a serem atingidos pela cárie precoce da infância.
- b) Em crianças menos de 2 anos de idade, as superfícies oclusais de molares superiores podem contribuir com mais de 90% do total de lesões.
- c) A região desmineralizada inicialmente se apresenta na forma de mancha branca próxima à região oclusal/incisal.
- d) Os incisivos inferiores, em geral, permanecem sem lesão devido a sua proximidade dos dutos de excreção das glândulas salivares submandibulares e sublingual.

30. A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado. De acordo com a Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017, são princípios do Sistema Único de Saúde e da Rede de Atenção à Saúde a serem operacionalizados na Atenção Básica, EXCETO:

- a) Universalidade.
- b) Equidade.
- c) Regionalização e Hierarquização.
- d) Integralidade.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30