



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

MUNICÍPIO DE MARINGÁ
EDITAL: Nº 052/2015
DATA DA PROVA: 21/02/2016

CARGO:
MÉDICO (GINECOLOGIA)
(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: Questões 01 a 05; **Matemática:** Questões 06 a 10;
Informática: Questões 11 a 15; **Conhecimentos Específicos:** Questões 16 a 40.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
5	Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA

O RELÓGIO

Rio de Janeiro , 1970

Passa, tempo, tic-tac
Tic-tac, passa, hora
Chega logo, tic-tac
Tic-tac, e vai-te embora
Passa, tempo
Bem depressa
Não atrasa
Não demora
Que já estou
Muito cansado
Já perdi
Toda a alegria
De fazer
Meu tic-tac
Dia e noite
Noite e dia
Tic-tac
Tic-tac
Tic-tac...

Vinícius de Moraes

01. Sobre o texto, considerando que as informações abaixo são Verdadeiras (V) ou Falsas (F), assinale a alternativa que apresente a sequência correta:

() há palavras no texto que dão ideia de movimento: dia; noite; bem depressa; não demora; passa; tempo.

() o autor está triste, por isso não quer que o tempo passe.

() A palavra “tempo”, na linha 1 do poema, é um vocativo, o qual não tem relação sintática com nenhum outro termo da oração e é “uma forma lingüística usada para chamamento ou interpelação ao leitor no discurso direto”;

() Poemas e poesias são tipologias e gêneros textuais, respectivamente.

() o texto apresenta figuras de linguagem: nas expressões “Tic-tac, tic-tac”, prosopopéia; e nas expressões “Dia e noite” e “Noite e dia”, antítese.

- a) V; F; V; F; V
- b) V; V; F; F; V
- c) V; F; F; V; F
- d) F; F; V; V; F

02. Assinale a alternativa que ordena a identificação da tipologia textual de cada texto abaixo:

1 – Descrição; 2 - Narração; 3 – Dissertação; 4 - Injuntivo

() Não parava de cantar, Antônio afirmando que ia para outro tempo enquanto o povo todo desconfiava que era para o outro mundo que ele ia, e só se ouvia o martelo martelando lá dentro, toc toc toc (...)

() Derreta a manteiga em fogo baixo. Junte a farinha e teste-a por 2 a 3 minutos. Junte o leite aos poucos, mexendo rapidamente para não empelotar (...)

() Por cima da moldura da porta há uma chapa metálica comprida e estreita, revestida de esmalte. Sobre um fundo branco, as letras negras dizem Conservatória Geral do Registro Civil. O esmalte está rachado e esboicelado em alguns pontos. (...)

() Esse novo código de relacionamento, que surgiu no início da década de 80, não pode ser definido como uma nova forma de designar a transa (relação sexual). Também não pode ser definido como um namoro relâmpago, pré-namoro ou uma variação da amizade colorida. O “ficar com” existe por si só; independe do namoro, da amizade ou de qualquer outra forma de vínculo. Ele é o átomo da relação (...)

- a) 3,4,1,2
- b) 4, 1,2,3
- c) 2, 4,1,3
- d) 2,1,3,4

03. Assinale a alternativa que completa as lacunas empregando o acento grave quando necessário:

- 1) O flanelinha foi ____ praça esperar ____ gorjeta;
- 2) A casa fica ____ esquerda da delegacia, onde o rapaz depôs contra ____ moça;
- 3) Eu disse ____ ele tudo que sabia;
- 4) Mesmo cansado fui ____ casa.

- a) à; a; à; à; à; à
- b) a; a; a; à; à; à
- c) à; à; a; a; a; a
- d) à; a; à; a; a; a

04. As orações subordinadas substantivas recebem o nome da função sintática que elas exercem em relação à oração principal. Assinale a alternativa que classifica corretamente as orações abaixo e indica que Suzana já é uma mulher sortuda:

- 1. Suzana não sabe que ganhou um carro no sorteio da TV.
- 2. Suzana não sabe se ganhou um carro no sorteio da TV.

- a) subordinada substantiva objetiva direta; oração 1.
 b) subordinada substantiva predicativa; oração 1.
 c) subordinada substantiva condicional; oração 2.
 d) subordinada substantiva subjetiva; oração 2.

05. Assinale a alternativa que apresenta os substantivos idênticos na forma, porém de gêneros e significados diferentes que substituem os significados em destaques abaixo:

1. Polícia prende **a parte do corpo** da quadrilha que levou 1 milhão de caixas eletrônicos.
 2. Recife, **o dinheiro** do Estado de Pernambuco, é a maior cidade do Nordeste para os foliões que no carnaval saem às ruas com o galo da Madrugada, em direção a Olinda.
 3. **O aparelho receptor** é uma emissora do Grupo Estado que tem como foco transmitir jornalismo 24 horas no ar. A missão é fazer uma cobertura em tempo real passando por todas as áreas, da política ao esporte.
 4. **A carga máxima permitida** segue cheio de passageiros.

- a) 1.a cabeça; 2. a capital; 3. o rádio; a lotação.
 b) 1.o cabeça; 2. a capital; 3.a rádio; 4. a lotação.
 c) 1.o cabeça; 2. a capital; 3.a rádio; 4.o lotação.
 d) 1.o cabeça; 2.o capital; 3.o rádio; o lotação.

QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA

06. A escola infantil Criança Feliz vacinou todos os seus alunos, sendo que 90% contra catapora e 70% contra sarampo. Determine o percentual de alunos que foram vacinados contra as duas doenças.

- a) 90
 b) 60
 c) 50
 d) 70

07. Encontre o valor da expressão numérica:

$$17 - [(5 \cdot 2 - 3) - (10 - \sqrt[3]{125})]^0 - [(\sqrt{16} : 2) \cdot 2^3]$$

- a) 1
 b) -1
 c) 0
 d) 2

08. Um ponto, no sentido matemático, é?

- a) um objeto que não pode ser decomposto em objetos menores
 b) um objeto de dimensão zero
 c) não possui graus de liberdade
 d) Todas as alternativas anteriores são corretas.

09. Na figura abaixo, sabemos que a soma dos ângulos externos é igual a 360° . Assim, calcule $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C}$.




Figura 1: $\alpha + \beta + \gamma = 360^\circ$

- a) 180°
 b) 540°
 c) 360°
 d) 240°

10. Um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a?

- a) um
 b) ele mesmo
 c) zero
 d) nenhuma das anteriores

QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA

11. Sistemas computacionais do mundo todo utilizam como parte de seu hardware um componente de memória bem comum para armazenar dados temporários que logo serão utilizados pelo CPU no processamento da informação. Este componente acima descrito também é conhecido como:

- a) Memória RAM.
 b) Memória BAM.
 c) Memória HDMI.
 d) Memória VGA.

12. Os sistemas operacionais como Linux e Windows utilizam-se de sistemas de arquivos para organizarem seus arquivos, dentre os mais comuns utilizados atualmente, no Linux e no Windows, por padrão temos RESPECTIVAMENTE:

- a) ext4 e ext3
 b) extLinux e extWin
 c) FAT e FAT16
 d) ext4 e NTFS

13. Utilizamos a internet cada vez mais, e uma das coisas mais observadas quando estamos online é a velocidade de conexão com a rede naquele

local específico. Sabe-se que as operadoras que proveem o serviço informam em seus contratos as velocidades de envio e recebimento de dados. Essas velocidades de envio e recebimento de dados do cliente são conhecidas, respectivamente, como:

- a) Download e load
 - b) Upload e Download
 - c) Ethernet e Recived
 - d) Download e Upload
-

14. O correio eletrônico é uma das formas de comunicação digital mais utilizadas nos meios corporativos. Por meio deste serviço é possível enviar e receber mensagens eletrônicas do mundo todo. Apesar dos muitos benefícios, algumas pessoas utilizam o serviço para enviar mensagens com conteúdos indesejados, ofensivos e muitas vezes perigosos (como vírus de computador). Essas mensagens indesejadas também são conhecidas como:

- a) ADSL
 - b) SMTP
 - c) SPAM
 - d) HTML
-

15. O editor de texto Microsoft Word 2013 é extremamente difundido devido às suas inúmeras funcionalidades e ao seu alto padrão de qualidade. Sabendo-se disso, ao se trabalhar com documentos do Microsoft Word é preciso conhecer seus tipos e extensões de arquivos. Dadas as alternativas, assinale a que contenha a extensão que este programa, por padrão, salva os arquivos.

- a) docx
- b) xlsx
- c) ppt
- d) xml

QUESTÕES 16A40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Sobre o calendário de vacinação do Ministério da Saúde, marque a assertiva correta:

- a) A vacina BCG deve ser feita assim que a criança nascer, independentemente do tempo de gestação e peso da criança.
- b) Ainda não existe vacina para Hepatite A.
- c) Sobre a vacina Dupla Adulto, em pacientes adultos que já receberam o esquema completo, a dose de reforço pode ser antecipada em caso de ferimentos graves, quando a última dose foi há mais de 5 anos.
- d) A vacina de Febre Amarela pode ser aplicada em crianças menores de 6 meses que irão viajar para locais de risco.

17. Com relação às doenças de notificação compulsória, é correto afirmar:

- a) Apenas médicos podem fazer a notificação de doenças compulsórias.
 - b) A notificação compulsória deve ser feita apenas para casos confirmados da doença.
 - c) A dengue não é uma doença de notificação compulsória.
 - d) Sobre as doenças de notificação compulsória imediata, a notificação deve ser feita em até 24 horas após o atendimento, para a autoridade superior cabível.
-

18. Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, marque a assertiva INCORRETA:

- a) Os primeiros casos de uma epidemia, em uma determinada área, não necessitam ser submetidos à investigação em profundidade.
 - b) O principal objetivo da investigação de uma epidemia ou surto de determinada doença infecciosa é identificar formas de interromper a transmissão e prevenir a ocorrência de novos casos.
 - c) Epidemia é a elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em um determinado lugar e período de tempo, caracterizando, de forma clara, um excesso em relação à frequência esperada.
 - d) Surto é tipo de epidemia em que os casos se restringem a uma área geográfica pequena e bem delimitada ou a uma população institucionalizada (creches, quartéis, escolas, etc.).
-

19. Marque a assertiva correta:

- a) O modo de transmissão da rubéola é por meio da picada de insetos contaminados com o vírus.
 - b) O período de incubação da dengue é de 3 a 15 dias, sendo em média 5 a 6 dias.
 - c) O homem é o principal reservatório da Leptospirose.
 - d) No Brasil, apenas cães são reservatórios da Raiva.
-

20. Conforme os princípios doutrinários do SUS, marque a assertiva correta:

- a) Equidade significa que todo cidadão deve ser tratado da mesma forma.
- b) Resolutividade é o princípio doutrinário que significa que o sistema tem que estar preparado para resolver qualquer doença do cidadão.
- c) A Universalidade garante atendimento para todos, exceto cidadãos que não contribuem para o sistema previdenciário.
- d) Equidade significa que todo cidadão é igual perante ao SUS e será atendido conforme sua necessidade, até o limite que o sistema puder oferecer.

21. Marque a assertiva correta:

- a) O diagrama de controle não é um bom método para verificar a presença de uma epidemia, e quando este for utilizado, deve-se empregar o período de tempo de um ano.
 - b) Para estabelecer um estado epidêmico de uma doença, é imprescindível o conhecimento da frequência habitual (nível endêmico) da mesma, naquele lugar e período.
 - c) Na investigação de casos de uma epidemia, a busca ativa de novos casos nunca deve ser feita, pois pode aumentar o número de casos novos.
 - d) Quando houver suspeita de uma epidemia, esta pode ser logo confirmada, pois não há nada que possa alterar o número de novos casos além de uma epidemia.
-

22. Marque a assertiva INCORRETA:

- a) A taxa de mortalidade infantil reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil.
 - b) A taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos de menores de dois anos de idade, por cem nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
 - c) A taxa de mortalidade neonatal precoce reflete, de maneira geral, as condições socioeconômicas e de saúde da mãe, bem como a inadequada assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.
 - d) A taxa de mortalidade neonatal tardia é o número de óbitos de 7 a 27 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
-

23. Segundo o Política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde, marque a assertiva INCORRETA.

- a) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas.
- b) Cada profissional de saúde pode estar cadastrado em apenas uma equipe de Saúde da Família, exceção feita somente ao profissional médico, que poderá atuar em, no máximo, duas equipes de Saúde da Família e com carga horária total de 40 horas semanais.
- c) Todos os profissionais membros da equipe de Saúde da Família devem cumprir carga horária de 40 horas semanais, sem exceção.
- d) O número de Agentes Comunitários de Saúde -ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família.

24. Com relação aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), marque a assertiva correta:

- a) O NASF 1 é composto por uma equipe menor e atende uma população menor que o NASF 2.
 - b) A composição do NASF de um determinado município é definida pelo Ministério da Saúde.
 - c) Os NASFs foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações de atenção básica, bem como sua resolubilidade.
 - d) Os NASFs são de livre acesso para atendimento individual.
-

25. Considerando um homem de 31 anos, que não possui nenhuma imunização prévia, quais vacinas deve receber segundo o calendário nacional de vacinações?

- a) Tríplice viral, Febre amarela, BCG.
 - b) VIP, Pneumocócica 10, Dupla Adulto.
 - c) Hepatite B, Dupla Adulto, Tríplice Viral.
 - d) Hepatite B, Meningocócica, Dupla Adulto.
-

26. Entre os diversos marcadores e fatores de risco gestacionais, presentes anteriormente à gestação, consideram-se relevantes para conceituar uma gravidez como de alto risco os seguintes:

- a) Tabagismo, cardiopatias maternas, doenças autoimunes e idade maior que 30 anos.
 - b) Idade menor que 17 anos, parto pré termo anterior, nefropatias e epilepsia.
 - c) Hipertensão arterial crônica, peso pré-gestacional menor que 55 kg (IMC < 21) abortamento habitual e cirurgia uterina anterior
 - d) Dependência de drogas, morte perinatal inexplicada, altura menor que 1,45m e síndrome hemorrágica anterior.
-

27. Qual dos esquemas a seguir representa a melhor opção para profilaxia das convulsões em pacientes gestantes com sinais de iminência de eclampsia ou na eclampsia :

- a) Dose de ataque: 2,0 g de MgSO₄ a 20% endovenosa lenta. Dose de manutenção: 1,0 a 2,0 g/h de MgSO₄ a 20% em BIC (bomba de infusão contínua).
- b) Dose de ataque: 5,0 g de MgSO₄ a 50% intramuscular. Dose de manutenção: 5,0 g de MgSO₄ a 50% intramuscular 6/6 horas.
- c) Dose de ataque: 10,0 g de MgSO₄ a 50% intramuscular. Dose de manutenção: 5,0 g de MgSO₄ a 50 % intramuscular 4/4 horas.
- d) Dose de ataque: 10,0 g de MgSO₄ a 50 % endovenoso. Dose de manutenção: 2,0 g de MgSO₄ a 20 % endovenoso em BIC.

28. Dentre as medidas definidas como formas de prevenção para Toxoplasmose em gestantes suscetíveis à infecção durante a gravidez, qual a alternativa INCORRETA?

- a) Lavar as mãos ao manipular alimentos, lavar bem as mãos após contato com animais.
 - b) Evitar que os gatos se alimentem de produtos de caça, evitar consumo de peixes crus.
 - c) Evitar contato com fezes de gato no lixo, não ingerir carnes cruas, mal cozidas ou mal passadas incluindo embutidos (salame, copa, etc).
 - d) Lavar bem frutas, legumes e verduras antes de se alimentar, lavar bem as mãos após manusear a carne crua.
-

29. Com relação ao acompanhamento pré natal de pacientes com infecção pelo HIV, é correto afirmar que:

- a) Na profilaxia da transmissão vertical do HIV, as gestantes que não tem indicação de tratar a infecção pelo HIV (assintomáticas e quando o dano imunológico é pequeno – LT-CD4+ \geq 350cél/mm³), a TARV com AZT deve ser iniciada precocemente, antes da 10^a semana.
 - b) As gestantes sintomáticas ou as gestantes assintomáticas com contagem de LT-CD4+ \leq 350 células/mm³ não apresentam critérios para início de tratamento.
 - c) Para profilaxia antirretroviral intraparto, durante o trabalho de parto ou no dia da cesárea programada, todas as gestantes infectadas devem receber AZT intravenoso desde o início do trabalho de parto ou pelo menos 3 horas antes da cesárea eletiva até o clampeamento do cordão umbilical.
 - d) O aleitamento materno é permitido nas pacientes que receberam tratamento efetivo durante toda a gravidez desde o 1^o trimestre e que apresentarem carga viral menor que 500 cópias/ml.
-

30. A placenta prévia faz parte dos quadros de hemorragia da 2^a metade da gravidez. Assinale a alternativa correta acerca de casos suspeitos de placenta prévia.

- a) Dentre os fatores de risco destacam-se: cesariana prévia, cirurgias uterinas prévias como a miomectomia, multiparidade, tabagismo e gemelaridade.
- b) São os principais sintomas: dor abdominal importante, sangramento genital de quantidade variável e persistência de dor entre as contrações durante o trabalho de parto.
- c) É importante realizar o toque vaginal para poder definir a localização da placenta.
- d) É mandatória a indicação de cesariana nas placentas classificadas como implantação baixa de placenta diagnosticadas em USG realizado até a 22^a semana de gestação.

31. Na análise de uma cardiocografia, são fatores a serem considerados:

- a) A linha de base é considerada normal quando encontra-se entre 120 e 170 bpm por um período mínimo de 10 minutos.
 - b) As desacelerações precoces são causadas por hipoxemia fetal e associam-se à diminuição do pH fetal e a maior morbidade e mortalidade perinatal.
 - c) As acelerações transitórias são definidas como ascensão abrupta da frequência cardíaca fetal, cujo acme é igual ou superior a 15 bpm em relação à linha de base com duração mínima de 15 segundos e máxima inferior a 2 minutos.
 - d) A presença de desacelerações precoces durante o período expulsivo é rara e constitui um indicativo de parto imediato pelo risco de sofrimento fetal.
-

32. A infecção de trato urinário (ITU) é comum na gravidez, ocorrendo entre 17 a 20 % das gestações e tem várias formas de manifestação. A respeito do diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes com ITU, é correto afirmar que:

- a) Todas as gestantes com pielonefrite devem ser hospitalizadas para tratamento endovenoso por pelo menos 7 dias.
 - b) Em cerca de 80 % dos casos de bacteriúria assintomática, a bactéria isolada é a *Klebsiella pneumoniae*.
 - c) A primeira opção de tratamento na gravidez é o uso de norfloxacino em doses usuais.
 - d) É importante o diagnóstico diferencial com apendicite, pneumonia, nefrolitíase e abscesso renal entre outras causas.
-

33. Durante a assistência pré natal, o diabetes mellitus associado à gravidez é classificado como diabetes gestacional (diagnóstico realizado durante a gravidez) e diabetes pré-gestacional (tipo 1, tipo 2 ou outro). Dentre as alternativas, assinale a considerada mais adequada:

- a) Recomenda-se triagem universal com teste oral de tolerância à glicose (TOTG) de 75 g a ser realizado entre 24 e 28 semanas.
- b) Na ausência de fatores de risco e glicemia de jejum inicial menor que 95 mg/dl, o rastreamento é considerado negativo e recomenda-se realização de nova glicemia de jejum entre 22 e 24 semanas.
- c) A medida de glicosúria é considerada adequada para a monitorização do controle metabólico na gravidez.
- d) A maioria das pacientes volta a apresentar níveis glicêmicos adequados no pós parto e não é necessária monitorização ao final do puerpério.

34. Segundo as Diretrizes Brasileiras para o rastreamento do Câncer de Colo do Útero (INCA – Ministério da Saúde), a colpocitopatologia oncológica como método de rastreamento para prevenção do Câncer de Colo do Útero deve:

- a) Ser realizada a cada 3 anos após a realização de 2 exames anuais consecutivos que estejam normais.
- b) Ser realizada inicialmente a partir dos 20 anos de idade para mulheres independente de sua história de atividade sexual.
- c) Ser realizada a partir do início da atividade sexual independentemente da idade.
- d) Ser realizada anualmente até os 70 anos de idade nas mulheres independentemente de histórico de lesões do colo.

35. Com relação às infecções vaginais, assinale a alternativa correta:

- a) São considerados microrganismos comuns da vaginose bacteriana *Gardnerella vaginalis*, *Mycoplasma hominis* e *Staphylococcus sp* e seu tratamento pode ser feito com Metronidazol 500mg via oral 12/12 h por 7 dias.
- b) A sífilis primária tem como manifestação um exantema maculopapular que pode envolver todo o corpo e inclui palmas, plantas e mucosas e o tratamento recomendado é Penicilina G benzatina 2,4 milhões de unidades IM em dose única.
- c) Entre as queixas principais de vaginite por fungo (Candidíase) estão prurido, queimação e corrimento e o tratamento preconizado é o uso de Tinidazol 2g via oral em dose única.
- d) Na infecção por *Chlamydia trachomatis* os sintomas refletem a infecção de glândulas ectocervicais resultando em descarga mucopurulenta ou secreções ectocervicais principalmente em mulheres jovens (< 25 anos) e seu tratamento recomendado é o uso de azitromicina 1g via oral em dose única ou doxiciclina 100mg 12/12 h por 7 dias.

36. Com relação às definições e aos cuidados das mulheres em transição menopáusicas, é correto afirmar que:

- a) A transição menopáusicas ocorre ao longo de um período de 4 a 7 anos, sendo a média de idade para seu início de 47 anos.
- b) Sintomas como a secura vaginal e dispareunia são pouco comuns na transição menopáusicas.
- c) Os fogachos estão associados a baixo nível de atividade física, redução de FSH, tabagismo e redução de progesterona.
- d) No rastreamento de osteoporose recomenda-se realização de medidas de densidade mineral óssea em todas as mulheres pós menopáusicas com (1) 50 anos ou mais, (2) histórico de fraturas ou (3) um ou mais fatores de risco para osteoporose.

37. A Síndrome do Ovário Policístico (SOP) afeta cerca de 4 a 12 % da população feminina em idade reprodutiva e é motivo comum de preocupação exagerada desta população com relação ao futuro reprodutivo. Considerando suas características para diagnóstico, fisiopatologia e tratamento, assinale a alternativa correta.

- a) Pelos critérios de Rotterdam 2003, para diagnóstico de SOP é necessária a presença de duas ou mais das seguintes condições: 1. Ovários policísticos (com exclusão de distúrbios relacionados) 2. Sinais clínicos e/ou bioquímicos de hiperandrogenismo 3. Oligo-ovulação ou anovulação.
- b) Na SOP, a alteração na pulsatilidade de GnRH (hormônio liberador da gonadotrofina) que resulta em produção preferencial de FSH (hormônio folículo estimulante) em detrimento do LH (hormônio luteinizante), frequentemente ficando a proporção FSH/LH na proporção acima de 2:1.
- c) Frequentemente a SOP está associada a obesidade e infertilidade a curto prazo, mas não há aumento de risco de diabetes melito ou câncer endometrial a longo prazo.
- d) O diagnóstico é simples e rotineiramente confirmado apenas com a presença em ovários com aspecto polimicrocístico em USG pélvica abdominal em mulheres usando contraceptivo oral.

38. Em uma paciente de 30 anos, nulípara, com relacionamento estável de mais de 5 anos, que não pense em engravidar nos próximos 3 anos e que tenha história prévia de trombose venosa profunda em membro inferior há 2 anos, está indicada como melhor opção de método contraceptivo:

- a) Anticoncepcionais orais combinados.
- b) Anel transvaginal.
- c) Dispositivo intrauterino contendo levonorgestrel.
- d) Esterilização feminina.

39. Uma menina adolescente de 15 anos de idade que ainda não apresentou sua menarca, que só apresentou telarca aos 12 anos e pubarca aos 13 anos, e que tenha exame ecográfico da pelve sem alterações detectáveis, tem como principal hipótese diagnóstica:

- a) Puberdade tardia.
- b) Puberdade normal.
- c) Hipogonadismo hipergonadotrófico.
- d) Hipogonadismo hipogonadotrófico.

40. Em uma paciente de 71 anos de idade, menopausada aos 55 anos, que fez terapia de reposição hormonal por 10 anos, atualmente com IMC (índice de massa corporal) de 32, hipertensa há 8 anos, controlada com medicação e que apresente um sangramento vaginal irregular, há indicação de investigação inicial com:

- a) Ressonância Nuclear magnética de pelve.
- b) Biópsia endometrial.
- c) Dosagem de CA 125.
- d) Citologia oncótica (exame de Papanicolaou).

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					