



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 360/2019

DATA DA PROVA: 14/04/2019

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA (NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 10; Noções de Legislação: 11 a 20;

Conhecimentos Específicos: 21 a 60.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 10:

Seria ingenuidade procurar nos provérbios de qualquer povo uma filosofia coerente, uma arte de viver. É coisa sabida que a cada provérbio, por assim dizer, responde outro, de sentido oposto. A quem preconiza o sábio limite das despesas, porque “vintém poupado, vintém ganhado”, replicará o vizinho farrista, com razão igual: “Da vida nada se leva”. (...)

Mais aconselhável procurarmos nos anexins não a sabedoria de um povo, mas sim o espelho de seus costumes peculiares, os sinais de seu ambiente físico e de sua história. As diferenças na expressão de uma sentença observáveis de uma terra para outra podem divertir o curioso e, às vezes, até instruir o etnógrafo.

Povo marítimo, o português assinala semelhança grande entre pai e filho, lembrando que “filho de peixe, peixinho é”. Já os húngaros, ao formularem a mesma verdade, não pensavam nem em peixe, nem em mar; ao olhar para o seu quintal, notaram que a “maçã não cai longe da árvore”.

Trecho de Paulo Rónai, em *Como aprendi o português e outras aventuras*.

01. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação mais adequada ao sentido global do texto.

- a) O autor enfatiza que os provérbios correspondem, sempre, de maneira fidedigna, ao modo de pensar coerente de um povo, não havendo oposições de sentido entre um provérbio e outro.
- b) O objetivo central do texto é demonstrar que a filosofia de um povo é encontrada nos provérbios que esse mesmo povo produz. A prova disso é que não existem provérbios com sentidos contrários entre si.
- c) O objetivo do texto é chamar a atenção para o ambiente e costumes presentes na criação dos provérbios, citando, por exemplo, a mesma verdade expressa em provérbios diferentes, como no caso dos provérbios do povo português e húngaro.
- d) Os provérbios representam a coerência do modo de pensar de uma nação. Não há a possibilidade de haver provérbios com sentidos contrários entre si, visto que toda a sabedoria de um povo é sempre coerente e representa uma filosofia e sua arte de viver.

02. Assinale a alternativa que apresenta o termo “sábio” sendo usado da mesma forma e desempenhando a mesma função sintática do que na frase “o sábio limite das despesas”.

- a) Um sábio disse ao outro: não importa o tempo, mas o que se faz dele.
- b) A sabedoria é para o sábio um grande tesouro que nunca se esgota.
- c) O verdadeiro sábio é aquele que se preocupa unicamente com aprender.
- d) O sábio pensamento de um povo consiste em conhecer sua identidade.

03. Assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE a função sintática do termo “sábio” na frase “o sábio limite das despesas”.

- a) Adjunto adnominal.
- b) Sujeito composto.
- c) Verbo de ligação.
- d) Predicado nominal.

04. Assinale a alternativa que apresenta somente termos com sentido contrário ao termo “peculiar”, presente em “o espelho de seus costumes peculiares”.

- a) Geral, particular, comum.
- b) Vulgar, ordinário, geral.
- c) Banal, comum, específico.
- d) Usual, único, vulgar.

05. Assinale a alternativa que apresenta a reflexão expressa nos provérbios “filho de peixe, peixinho é” e “a maçã não cai longe da árvore”.

- a) A vida de um filho vale mais do que as riquezas.
- b) Os pais não devem se preocupar com o futuro dos filhos.
- c) Os filhos geralmente têm características semelhantes aos pais.
- d) A verdadeira função de um pai é proteger seu filho.

06. Assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE a função sintática do termo “é”, em “filho de peixe, peixinho é”.

- a) Conjunção aditiva.
- b) Conjunção adversativa.
- c) Verbo de ligação.
- d) Verbo transitivo.

07. Assinale a alternativa que apresenta o sujeito da frase “não pensavam nem em peixe, nem em mar”.

- a) Os húngaros.
- b) Os provérbios.
- c) Os portugueses.
- d) Os pais.

08. Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a função sintática desempenhada pelo termo “maçã” em “a maçã não cai longe da árvore”.

- a) Núcleo do sujeito.
- b) Adjunto adnominal.
- c) Predicado verbo-nominal.
- d) Predicado verbal.

09. Assinale a alternativa que apresenta o termo que está na origem da palavra “aconselhável”:

- a) Concelho.
- b) Conselho.
- c) Concílio.
- d) Conciliar.

10. A respeito do termo “ganhado”, presente no provérbio “vintém poupado, vintém ganhado”, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

- I. O termo está no masculino e no singular, concordando com o termo “vintém”.
- II. “Ganhado” é um dos participípios do verbo “ganhar”.

- a) Somente a afirmativa I está correta.
- b) Somente a afirmativa II está correta.
- c) Nenhuma afirmativa está correta.
- d) Ambas as afirmativas estão corretas.

QUESTÕES 11 A 20 - NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO

11. É proibido ao Servidor Público, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, EXCETO:

- a) Faltar ou ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato.
- b) Acatar ou cumprir ordens emanadas de autoridade competente.
- c) Trabalhar com negligência, em detrimento do serviço.
- d) Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.

12. Sobre a Acumulação, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, assinale a alternativa CORRETA:

- a) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, para todos os cargos.
- b) É permitida a acumulação em caso de percepção de pensões civis e militares.

- c) O servidor não pode exercer, simultaneamente, mais de uma função de direção, chefia e assessoramento, bem como receber, cumulativamente, vantagens pecuniárias dessa natureza, nem mesmo no Quadro do Magistério.
- d) É vedada a acumulação de pensões com provento ou remuneração.

13. A respeito da responsabilidade do servidor, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada, no caso de absolvição criminal, mesmo que confirmada sua autoria.
- b) A responsabilidade administrativa resulta de atos infracionais praticados ou omissões ocorridas no desempenho do cargo ou função.
- c) As cominações civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si.
- d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responde civil, penal e administrativamente.

14. Sobre a publicidade dos atos do Município, segundo a Lei Orgânica do Município de São José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A publicação das leis e atos municipais far-se-á por meio de órgão eletrônico oficial do município e/ou por meio de órgão de imprensa local e/ou por imprensa oficial do Estado.
- b) Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação.
- c) Nunca poderão ser publicados atos de forma resumida, mesmo que forem atos normativos.
- d) Se as publicações das leis e atos oficiais do Município foram realizadas por órgão eletrônico oficial, deverá ser disponibilizado na forma impressa, mediante solicitação dos interessados.

15. Segundo a Lei Orgânica do Município de São José dos Pinhais, qual dos Atos Administrativos a seguir, NÃO trata-se de um DECRETO:

- a) Provimento a vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individuais.
- b) Declaração de utilidade pública ou necessidade social, para fins de desapropriação ou de servidão administrativa.
- c) Permissão de uso dos bens municipais.
- d) Fixação e alteração de preços.

16. Segundo a Lei Orgânica do Município de São José dos Pinhais, são Direitos dos Servidores Públicos, EXCETO:

- a) Vencimentos ou proventos não inferiores ao salário mínimo.

b) Duração de jornada de trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultadas a compensação de horário, escalas e redução de jornada.

c) Gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos, com um terço a mais que a remuneração normal, vedada a contagem em dobro.

d) Adicionais por tempo de serviço, na forma que a lei estabelecer.

17. Enumere as colunas, sobre as espécies de atos administrativos:

- (1) NORMATIVOS,
- (2) ORDINÁRIOS,
- (3) NEGOCIAIS,
- (4) ENUNCIATIVOS,
- (5) PUNITIVOS.

() Envolvem o poder disciplinar, por sua vez, são de efeito externo, por exemplo, as suspensões e advertências.

() São atos administrativos apenas no sentido formal, pois não expressam a vontade, mas declaram, por exemplo, certidões e atestados.

() A título de exemplo, as licenças, autorizações, permissões, aprovações, admissões e dispensas.

() Têm a ver com o poder hierárquico, o qual se encontra entre a autoridade e o servidor. Basicamente, é o poder de ordenar, comandar, fiscalizar e corrigir as condutas dos seus subalternos. Exemplo, portarias.

() É por meio da autoridade que tem o poder de editá-los, explicar e especificar um comando já contido em lei. Exemplo, decretos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- a) 5, 4, 3, 1, 2.
- b) 3, 4, 5, 1, 2.
- c) 5, 4, 3, 2, 1.
- d) 3, 4, 5, 2, 1.

18. Sobre o atendimento aos usuários do SUS, segundo a Lei 8080/90, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

b) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.

c) As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde.

d) Oferta de procedimentos terapêuticos somente em ambiente hospitalar.

19. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre como serão alocados os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS):

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.

c) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

d) Investimentos previstos no Plano quadrienal do Ministério da Saúde.

20. Segundo a Portaria GM/MS n.º 1.886 de 18 de dezembro de 1997, o município deve cumprir os seguintes REQUISITOS para sua inserção ao Programa Agentes Comunitários de Saúde, EXCETO:

a) Apresentar ata de reunião do Conselho Municipal de Saúde onde está aprovada a implantação do programa.

b) Comprovar a existência de Fundo Municipal de Saúde ou conta especial para saúde.

c) Definir Unidade Básica de Saúde para referência e cadastramento dos Agentes Comunitários de Saúde no SAI/SUS.

d) Garantir a existência de profissional(ais) enfermeiro(s), com dedicação integral na(s) unidade(s) básica(s) de referência, onde no âmbito de suas atribuições exercerão a função de instrutor supervisor, na proporção de no máximo 20 Agentes Comunitários de Saúde para 01 (um) enfermeiro.

QUESTÕES 21 A 60 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O bloqueio do nervo alveolar superior posterior é um bloqueio anestésico comumente utilizado, sendo eficaz para as polpas dos primeiros, segundos e terceiros molares superiores. Em relação à sua técnica, assinale a alternativa a seguir que apresenta a CORRETA área de introdução da agulha:

a) Na altura da prega mucovestibular acima do segundo pré-molar superior.

b) Na altura da prega mucovestibular acima do primeiro molar superior.

c) Na altura da prega mucovestibular acima do segundo molar superior.

d) Na altura da prega mucovestibular acima do terceiro molar superior.

22. A prática de qualquer técnica radiográfica exige uma série de cuidados durante a sua execução. Assim sendo, há necessidade do profissional conhecer os posicionamentos da cabeça do paciente para cada técnica e os ângulos de incidência do feixe de Raios-X para cada região a ser radiografada. Em relação à Técnica Radiográfica Periapical da Bissetriz para molares superiores, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A posição do longo eixo do filme deve ser perpendicular ao plano horizontal.
- b) O filme deve ser fixado pelo paciente através do dedo indicador da mão do lado oposto.
- c) O Plano Sagital Mediano do paciente deve estar paralelo ao Plano Horizontal.
- d) A área de incidência do feixe de Raios-X deve ser 1 cm atrás do ponto de intersecção da Linha Trágusa do Nariz com a linha baixada da comissura palpebral externa.

23. O periodonto saudável garante o apoio necessário para a manutenção dos dentes em função. De acordo com a anatomia e fisiologia das estruturas de suporte do dente, analise as afirmativas a seguir:

- I. O periodonto é constituído somente por três componentes: gengiva, ligamento periodontal e cimento.
- II. O ligamento periodontal é composto por um tecido epitelial ricamente vascularizado.
- III. O cimento é um tecido avascular que forma a camada mais externa da raiz do dente.
- IV. Há dois tipos principais de cimento radicular: acelular (primário) e celular (secundário).

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

24. O primeiro requisito para a produção de Raios-X é uma fonte geradora de elétrons. Tais elétrons deverão ser acelerados e ganhar energia cinética, o que é realizado pela diferença de potencial aplicada aos dois pólos de um tubo de Raios-X. De acordo com as propriedades das radiações X, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Caminha em linha reta.
- b) É convergente.
- c) É desviada pelos campos elétricos e magnéticos.
- d) Não penetra corpos opacos.

25. Os acidentes e complicações que podem ocorrer nos pacientes submetidos às diferentes técnicas anestésicas são diversos, como por exemplo, a fratura e retenção de agulhas dentro dos

tecidos. Em relação a esta complicação, assinale a alternativa a seguir que apresenta a técnica preventiva CORRETA:

- a) As agulhas de calibre 30 são as mais apropriadas para as técnicas de bloqueio dos nervos alveolar inferior, mandibular, infraorbitário e maxilar.
- b) É indicado utilizar agulhas com calibre menor para técnicas que requerem profundidade de penetração nos tecidos moles.
- c) É indicado utilizar agulhas curtas para técnicas que requerem profundidade significativa de penetração nos tecidos moles.
- d) Não é recomendado redirecionar a agulha uma vez que esta está inserida nos tecidos.

26. Um diagnóstico apropriado é essencial para um tratamento adequado. O diagnóstico periodontal deve primeiro determinar se a doença está presente, e então identificar seu tipo, extensão, distribuição e gravidade. Em relação às características dos diferentes tipos de periodontite, analise as afirmativas a seguir:

- I. A periodontite crônica possui progressão rápida.
- II. A periodontite agressiva localizada acomete primeiros molares e incisivos.
- III. A periodontite ulcerativa necrosante possui maior prevalência em pacientes idosos.
- IV. A periodontite crônica possui distribuição generalizada na cavidade bucal.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

27. A apicetomia é o tratamento de patologias perirradiculares por meio da abordagem cirúrgica, consistindo na ressecção da porção radicular que contém o espaço do canal não-debridado para obturação apical e vedação adequada do canal. São indicações para a apicetomia, EXCETO:

- a) Problemas anatômicos impedindo debridamento/obturação radicular por completo.
- b) Causas não-identificadas de insucesso no tratamento endodôntico.
- c) Fratura horizontal da raiz com necrose apical.
- d) Grandes lesões periapicais que não regridem com o tratamento endodôntico convencional.

28. A caracterização da sintomatologia representa um dos principais critérios de diagnóstico da polpa dentária alterada pela inflamação, especialmente no que refere-se à sua reversibilidade ou não à normalidade. De acordo com os sinais

e características sintomatológicas dos diferentes estágios de pulpíte, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Na pulpíte irreversível, a dor é espontânea, podendo ser difusa, dificultando a localização por parte do paciente.
- b) Quando um dente com pulpíte reversível é acessado, ocorre discreto sangramento.
- c) Em quadros de pulpites irreversíveis, a dor só é aliviada com o uso de analgésicos comuns.
- d) Quando um dente com pulpíte irreversível é acessado, a polpa apresenta consistência firme e oferece resistência ao corte.

29. As próteses parciais removíveis são aparelhos protéticos que tem por finalidade substituir os dentes naturais ausentes em pacientes parcialmente desdentados, e podem ser removidos e reposicionados na boca, sempre que necessário. Elas são constituídas pelos seguintes elementos: retentores, sela, dentes artificiais e conectores. Em relação aos retentores, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os retentores são postos para preencher os espaços protéticos, unir os dentes artificiais entre si e com a grade retentiva da armação metálica.
- b) Os retentores indiretos se relacionam com os dentes pilares situados vizinhos ao espaço protético.
- c) Os retentores podem ser do tipo intracoronário (retentores a encaixe) ou extracoronário (retentores a grampos).
- d) Os retentores diretos também são chamados de estabilizadores, pois apresentam como função principal estabilizar a prótese.

30. O amálgama dentário é um material bastante utilizado para restaurar dentes posteriores, devido a sua versatilidade, seu baixo custo e suas excelentes propriedades físicas. Como desvantagem, esse material não apresenta adesão à estrutura dental, tornando necessário que características específicas sejam observadas na forma do preparo. De acordo com as características finais de um preparo cavitário classe II para uma restauração de amálgama, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A caixa oclusal deve possuir paredes em contato com as pontes de esmalte divergentes para oclusal.
- b) A caixa proximal deve possuir paredes vestibular e lingual expulsivas para proximal e convergentes para oclusal.
- c) A caixa oclusal deve possuir paredes vestibular e lingual ligeiramente divergentes para a oclusal.
- d) A caixa proximal deve possuir parede gengival formando um ângulo de 45° graus com o plano oclusal.

31. A extração dentária é um procedimento que incorpora os princípios de cirurgia e muitos princípios de física e mecânica. Quando se aplicam corretamente tais princípios, um dente pode ser removido intacto do processo alveolar sem sequelas. De acordo os princípios mecânicos e técnicas envolvidas na extração dentária, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Na luxação de um dente com o fórceps, as forças devem ser aplicadas nas direções vestibular e lingual de maneira lenta e pausada.
- b) Na exodontia de dentes inferiores, o profissional deve utilizar sua mão esquerda para proteger o processo alveolar.
- c) Na utilização da alavanca para a luxação de um dente, o seu cabo deve ser girado de maneira vigorosa e rápida.
- d) O fórceps deve se adaptar anatomicamente ao dente, não ultrapassando apicalmente a linha cervical.

32. A abertura coronária é a fase operatória inicial do tratamento endodôntico, permitindo o acesso ao interior da cavidade pulpar através da remoção do teto da câmara pulpar com o objetivo de permitir acesso ao forame apical. De acordo com princípios da abertura coronária, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Toda abertura coronária deverá ser feita de tal maneira que ofereça um acesso direto ao canal radicular por meio de linha reta.
- b) A parede cervical ou assoalho da câmara pulpar não deverá ser deformado.
- c) O limite da abertura coronária deverá incluir no seu interior, ao menos, um dos cornos pulpares, não removendo as retenções das paredes da câmara.
- d) Todas as saliências do teto ou parede oclusal ou parede incisal da câmara pulpar devem ser eliminadas.

33. Os materiais de moldagem usados atualmente podem ser classificados de acordo com sua composição, seu mecanismo de presa, suas propriedades mecânicas e indicações. De acordo com a classificação dos grupos de materiais de moldagem, assinale a alternativa a seguir que apresente um material hidrocolóide:

- a) Alginato.
- b) Godiva.
- c) Polissulfeto.
- d) Silicone por adição.

34. O uso de próteses totais pode levar a alterações nos tecidos de suporte e nos demais tecidos que as circundam. São patologias associadas ao uso de próteses totais, EXCETO:

- a) Candidíase eritematosa.
- b) Epúlíde fissurada.
- c) Crescimento das tuberosidades maxilares.
- d) Hiperplasia inflamatória na região de palato mole.

35. Um sistema adesivo odontológico deve possuir três funções: promover resistência à separação de um substrato aderente de um material restaurador ou de cimentação, distribuir tensão ao longo da superfície de colagem e selar a interface, aumentando a resistência à microinfiltração. De acordo com os fatores que podem afetar o sucesso do sistema adesivo, analise as afirmativas a seguir:

- I. O tempo ideal de aplicação do agente condicionante pode variar, dependendo de exposições prévias da estrutura dental ao flúor.
- II. As superfícies condicionadas devem ser mantidas limpas e suficientemente secas até que o adesivo seja aplicado.
- III. Uma vez que o dente é condicionado, o ácido deve ser removido com enxague com um jato de água por aproximadamente 5 segundos.
- IV. Quando apenas o esmalte é condicionado, a superfície deve ser completamente seca até que o esmalte adquira uma aparência brilhante.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

36. O cimento de ionômero de vidro é um material que tem sido cada vez mais empregado na Saúde Pública, as duas principais características que o torna aceitável para a prática odontológica são a sua capacidade de se unir à dentina e a de liberar fluoretos. Em relação à manipulação do cimento de ionômero de vidro, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O material deve ser manipulado até apresentar aparência opaca, para assim ser inserido na cavidade.
- b) O pó deve ser dividido em três partes iguais, incorporando-as separadamente ao componente líquido.
- c) O pó e o líquido devem ser dispensados somente no momento da mistura, para que não ocorra a evaporação da água contida no componente líquido.
- d) O tempo de manipulação recomendado pelo fabricante varia de 60-90 segundos.

37. A profilaxia antibiótica consiste na administração de antibióticos previamente a manipulação de regiões anatômicas onde não temos infecção instalada. Seu uso se faz com a finalidade de evitar o estabelecimento de infecção devido à presença da flora normal ou de possíveis microrganismos presentes. Em relação ao uso

profilático de antibióticos na odontologia, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os antibióticos devem ser administrados em baixas doses para se evitar a criação de resistência bacteriana.
- b) Anestesia local infiltrativa não necessita de profilaxia antibiótica, mesmo que o paciente apresente alguma situação de risco.
- c) Pacientes adultos sem história de alergia às penicilinas, devem ser medicados com 2 gramas de amoxicilina 03 horas antes do procedimento.
- d) Pacientes adultos com história de alergia às penicilinas, devem ser medicados com 2 gramas de clindamicina 01 hora antes do procedimento.

38. Apesar do enorme progresso na tecnologia disponível para preservar a dentição, há ainda a necessidade de reabilitação protética do sistema mastigatório em pacientes total ou parcialmente edêntulos. O objetivo da cirurgia pré-protética é criar estruturas de suporte adequadas para a posterior colocação dos aparelhos protéticos. A área ideal de suporte para uma prótese deve apresentar as seguintes características, EXCETO:

- a) Presença de tecido ósseo ou de tecido mole protuberante.
- b) Relação apropriada dos maxilares nas dimensões ântero-posterior, transversal e vertical.
- c) Mucosa ceratinizada na área de suporte da prótese primária.
- d) A forma ideal do processo alveolar é de um rebordo largo e em forma de "U".

39. Medo e dor estão sempre inter-relacionados. A influência dos fatores psicológicos sobre a dor faz com que pacientes ansiosos apresentem um limiar de dor mais baixo do que pacientes em estado normal. Esses pacientes quase sempre necessitam de abordagens farmacológicas especiais para permitir a realização do tratamento odontológico. Em relação ao controle farmacológico da ansiedade em odontologia, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O controle farmacológico pode ser realizado através de duas formas: pela administração de medicamentos por via oral ou através da utilização da via inalatória.
- b) O Diazepam promove, além do efeito ansiolítico, relaxamento muscular e efeito anticolinérgico.
- c) O Hidrato de Cloral pode ser considerado para o tratamento de crianças rebeldes.
- d) Os ansiolíticos são medicamentos que têm como objetivo a redução da ansiedade, sendo a classe dos anti-histamínicos a mais utilizada.

40. A seleção dos dentes para aplicação de selantes de fósulas e fissuras depende mais da atividade de cárie do paciente do que das

condições de um dente individualmente. De acordo com as recomendações para utilização de selantes da Academia Americana de Odontologia Pediátrica (2004), assinale a alternativa CORRETA:

- a) A colocação de selantes em lesões de cárie de esmalte pequenas não tem se mostrado um procedimento efetivo na inibição da progressão da lesão.
- b) O risco de cárie e o benefício potencial do selante pode existir em qualquer dente com sulco ou fissura, desde que seja um dente permanente.
- c) A melhor avaliação de risco é a realizada usando os seguintes indicadores: morfologia dental, diagnóstico clínico, história passada de cárie, uso de flúor e estado atual de higiene bucal.
- d) Os métodos de colocação do selante devem incluir a limpeza cuidadosa dos sulcos e das fissuras com consequente remoção do esmalte.

41. A inflamação pulpar pode ser iniciada por processos cariosos ou contatos prematuros. Após a ação do agente agressor, ocorre, inicialmente, uma reação inflamatória incipiente denominada de hiperemia pulpar. De acordo com o diagnóstico clínico e tratamento das hiperemias pulpares, analise as afirmativas a seguir:

- I. Paciente apresenta dor de curta duração e localizada.
- II. A proteção pulpar indireta é o tratamento indicado.
- III. A natureza da dor é aguda e provocada.
- IV. A polpa ainda apresenta vitalidade.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

42. A restauração direta em dentes posteriores com resinas compostas é um desafio frequente na prática clínica diária. O desenvolvimento de técnicas e sistemas para restaurações indiretas em resina composta (inlays e onlays) visa minimizar algumas desvantagens das resinas compostas convencionais. Em relação às características do sistema indireto, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Dificulta a obtenção de contornos e contatos proximais mais precisos.
- b) Permite controlar a contração de polimerização da resina composta.
- c) Possui melhor resistência ao desgaste.
- d) Minimiza problemas como microfaturas da estrutura dentária e fenda marginal.

43. Devido a sua comprovada eficácia, custo reduzido e facilidade de aplicação, os bochechos com soluções à base de fluoretos alcançaram grande popularidade no meio odontológico, difundindo-se em um curto período a praticamente todas as regiões do mundo. Em relação aos bochechos com flúor, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Possui facilidade de aplicação por pessoal não especializado e rápida compreensão da técnica de uso pelas crianças.
- b) Em crianças de 3 a 5 anos, o método só deve ser utilizado sob supervisão direta, para evitar que engulam a solução.
- c) Aplicação não deve ser realizada fora do ambiente clínico, pois há a necessidade de profilaxia prévia para remoção da placa bacteriana.
- d) Após o bochecho, aconselha-se não ingerir nada por, no mínimo, 30 minutos.

44. Para que o cirurgião-dentista reconheça o anormal, primeiramente é necessário o perfeito conhecimento do normal. Na realização da interpretação radiográfica, é imprescindível um sólido subsídio da anatomia do complexo estrutural dentomaxilomandibular e estruturas adjacentes. Assinale a alternativa a seguir que contém a estrutura que se apresenta de maneira radiopaca em exames radiográficos intrabucais:

- a) Órgão do esmalte.
- b) Linha milo-hióidea.
- c) Forame mental.
- d) Sutura alveolar mediana.

45. Os anestésicos locais são soluções extensamente utilizadas como agentes para a anestesia e analgesia durante o transoperatório e o pós-operatório. Estruturalmente, possuem em sua maioria um grupo aromático associado a um grupo amina, esses dois grupos são ligados por uma cadeia intermediária que determina a classificação do anestésico local como amida ou éster. Assinale a alternativa a seguir que apresenta um anestésico local classificado como amida:

- a) Bupivacaína.
- b) Benzocaína.
- c) Tetracaína.
- d) Procaína.

46. As doenças periodontais apresentam grande prevalência na espécie humana, representando uma das maiores causas de perdas dentárias na população. Compreendem um grupo de lesões de caráter inflamatório que afetam os tecidos de proteção e sustentação dos dentes. Em relação às medidas preventivas das doenças periodontais, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A prevenção e o controle da formação da cárie dentária constituem a medida mais importante para a manutenção saudável da estrutura periodontal.
- b) O biofilme, uma vez removido, torna a formar-se de imediato, constituindo instantaneamente um fator deletério para a saúde gengival.
- c) Do ponto de vista periodontal, a escovação dentária deve ser realizada, no mínimo, três vezes ao dia.
- d) Um tratamento periodontal não é considerado definitivo, o intervalo de tempo para a manutenção periódica preventiva depende de cada indivíduo.

47. O diagnóstico periodontal é determinado após uma análise cuidadosa do histórico do caso e da avaliação dos sinais e sintomas clínicos, assim como o resultado de vários testes. O diagnóstico deve, portanto, incluir uma avaliação geral do paciente e considerações sobre a cavidade oral. Em relação aos métodos de diagnóstico da doença periodontal, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Um elemento dentário com mobilidade grau III possui mobilidade grave vestibulolingual e mesiodistal, porém não possui deslocamento vertical.
- b) A sensibilidade à percussão é uma característica de inflamação aguda no ligamento periodontal.
- c) O principal método diagnóstico para a detecção de bolsas periodontais é o exame radiográfico.
- d) Na sondagem periodontal, a sonda deve ser inserida perpendicularmente ao eixo vertical do dente.

48. Sabe-se que as exposições ocupacionais a materiais biológicos potencialmente contaminados constituem um sério risco aos profissionais da área da saúde nos seus locais de trabalho. Riscos ocupacionais seriam as possibilidades e as probabilidades de ocorrência de acidentes durante atividades profissionais. Em relação a tais riscos, analise as afirmativas a seguir:

- I. Sífilis, gonorreia, tuberculose, difteria e parotidite virótica são doenças passíveis de transmissão durante o atendimento odontológico.
- II. A transmissão percutânea ocorre quando existe o contato com respingos na face envolvendo olhos, nariz e boca.
- III. A transmissão cutânea ocorre quando existe lesão provocada por instrumentos perfurantes e cortantes.
- IV. O ambiente odontológico possibilita que o ar seja uma via potencial de transmissão de microrganismos, por meio das gotículas e dos aerossóis.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

49. Os traumatismos dentários representam um problema de saúde pública entre crianças e adolescentes devido à sua alta prevalência. As lesões por luxação são causadas por traumas e caracterizam-se pelo comprometimento do ligamento periodontal e do feixe vasculonervoso periapical. De acordo com a classificação das lesões por luxação em dentes decíduos, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A concussão caracteriza-se pela ruptura de fibras do ligamento periodontal, aumentando a mobilidade do dente acometido.
- b) Na subluxação, a lesão restringe-se às fibras do ligamento periodontal e não provoca mobilidade anormal do dente acometido.
- c) A concussão é diagnosticada pela dor à percussão, sensação de dente “crescido” e “dormente”.
- d) A luxação lateral envolve ruptura e laceração das fibras do ligamento periodontal e, clinicamente, observa-se o dente em infra-oclusão.

50. O tratamento endodôntico de dentes decíduos tem como objetivo preservar, até a sua esfoliação fisiológica, dentes com comprometimento pulpar irreversível devido à lesão cariosa ou episódio de traumatismo. Em relação à técnica de biopulpectomia em dentes decíduos, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Após a remoção completa do tecido cariado, da polpa coronária e cateterismo do canal radicular, deve-se efetuar a odontometria, explorando além do limite do bisel de rizólise.
- b) O uso do curativo de demora é fundamental para o sucesso do tratamento, objetivando-se a eliminação dos microrganismos presentes na polpa radicular.
- c) Previamente à instrumentação, deve-se realizar a neutralização do conteúdo tóxico a fim de evitar a extrusão de conteúdo necrótico para a região periapical.
- d) O hipoclorito de sódio a 1% pode ser utilizado como solução irrigadora durante toda a instrumentação.

51. O Tratamento Restaurador Atraumático foi desenvolvido inicialmente com o objetivo de oferecer atenção odontológica às populações africanas que não contavam com atendimento, o objetivo desta abordagem é paralisar a desmineralização no microambiente da lesão cariosa de dentes decíduos e permanentes. São indicações do Tratamento Restaurador Atraumático, EXCETO:

- a) Atendimento de bebês.
- b) Dentes com sinais de pulpite irreversível.
- c) Restauração de lesões cariosas em dentina.
- d) Atendimento de pacientes com necessidades especiais.

52. A confecção de uma prótese total é realizada em diversas etapas: moldagem anatômica, moldagem funcional, bases de prova, planos de orientação, montagem dos modelos em articulador e montagem dos dentes artificiais. Em relação à moldagem funcional, analise as afirmativas a seguir:

I. Pode ser dividida em duas fases distintas: o vedamento periférico e a moldagem funcional propriamente dita.

II. A moldeira individual pode ser confeccionada com resina composta fotopolimerizável.

III. Primeiramente realiza-se o vedamento periférico e posteriormente os ajustes da moldeira individual.

IV. Pastas à base de óxido de zinco e eugenol são utilizadas como material de moldagem.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

53. Os profissionais da área da saúde, por estarem mais expostos, possuem um risco elevado de contrair doenças infecciosas, devendo estar devidamente imunizados. O profissional deve estar atento às características da região e da população a ser atendida, sendo recomendável estar vacinado contra:

- a) Tuberculose.
- b) Sífilis.
- c) Hanseníase.
- d) Hepatite C.

54. A avulsão dentária caracteriza-se pelo deslocamento completo do dente de seu alvéolo em decorrência de um impacto súbito como uma pancada, colisão com um objeto sólido ou durante uma queda. Em relação às avulsões dentárias e seus tratamentos, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A imobilização de dentes reimplantados deve ser realizada logo após o reposicionamento e tem como objetivo propiciar estabilidade no período inicial de cicatrização.
- b) Nos dentes com rizogênese completa, cujo reimplante foi imediato ou que foram mantidos em meio adequado por um período menor que 60 minutos, o tratamento endodôntico não está indicado.
- c) Os fatores mais decisivos para a revascularização pulpar são o diâmetro apical no momento do reimplante, a duração do período extrabucal e tipo de meio de armazenamento.
- d) O reimplante de dentes com rizogênese incompleta mantidos em meios de armazenamento inadequado ou cujo período extrabucal excedeu 60 minutos, apresenta um prognóstico desfavorável.

55. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doença - CDC, a chance de resolução de um acidente ocupacional na área da saúde é maior quando a quimioprofilaxia é iniciada nas duas primeiras horas da ocorrência. Em relação às condutas que devem ser tomadas pelo profissional após exposição ao material biológico, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Nos acidentes de alto risco para Hepatite B, a quimioprofilaxia pode ser iniciada até uma a duas semanas depois.
- b) O ferimento não deve ser lavado antes do atendimento no Centro de Referência no atendimento de acidentes ocupacionais com material biológico da região.
- c) Deve-se obter do paciente-fonte uma anamnese recente e detalhada sobre seus hábitos de vida, história de hemotransfusão, uso de drogas e vida sexual.
- d) Deve ser solicitada pelo médico a coleta de amostras de sangue do profissional e do paciente-fonte.

56. No âmbito mundial, nas últimas décadas tem sido observado um importante declínio na prevalência da doença cárie. Entretanto, em alguns países em desenvolvimento, isto ainda é uma realidade na maioria das suas populações. O processo de formação da cárie é influenciado por uma multiplicidade de fatores, chamados fatores determinantes. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um fator classificado como determinante no processo de formação da cárie:

- a) Biofilme dentário.
- b) Composição da saliva.
- c) Composição e frequência da dieta.
- d) Presença de fluoretos.

57. A parada cardiorrespiratória corresponde à principal e mais grave manifestação de urgência dentro de um consultório odontológico, haja vista elevada morbimortalidade. A realização imediata de ressuscitação cardiopulmonar contribui sensivelmente para o aumento das taxas de sobrevivência das vítimas de parada cardíaca. De acordo com a I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a sequência CORRETA do Suporte Básico a Vida é:

- a) Chame ajuda, avalie a segurança do local, avalie a responsividade e respiração da vítima, cheque o pulso e inicie ciclos de 30 compressões e 2 ventilações.
- b) Avalie a responsividade e respiração da vítima, chame ajuda, avalie a segurança do local, inicie ciclos de 30 compressões e 2 ventilações e cheque o pulso.

- c) Avalie a segurança do local, avalie a responsividade e respiração da vítima, chame ajuda, cheque o pulso e inicie ciclos de 30 compressões e 2 ventilações.
 d) Avalie a segurança do local, avalie a responsividade e respiração da vítima, cheque o pulso e inicie ciclos de 30 compressões e 2 ventilações, chame ajuda.

58. Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, as atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir determinadas disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma das profissões. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, são atribuições comuns dos cirurgiões-dentistas:

- a) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal.
 b) Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal.
 c) Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos.
 d) Coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos.

59. Conforme decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço. São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços:

- a) De vigilância em saúde.
 b) De atenção primária.
 c) De atenção ambulatorial especializada.
 d) De atenção ambulatorial hospitalar.

60. O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da Atenção Básica, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. São diretrizes do SUS, EXCETO:

- a) Participação da comunidade.
 b) Atendimento integral.
 c) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
 d) Atendimento com prioridade para as atividades curativas.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60